

INTRODUCTION

Le paludisme est une maladie redoutable, surtout pour les populations vulnérables comme les femmes enceintes et les enfants de moins de cinq ans. La réduction des décès dus au paludisme de 585 000 à 405 000 entre 2010 et 2018 est une avancée notable, reflétant les efforts mondiaux pour lutter contre cette maladie.

OBJECTIFS

Décrire les aspects épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et évolutifs du paludisme grave chez les enfants de moins de 5 ans dans le service de pédiatrie de l'hôpital de Kouroussa.



PATIENTS ET MÉTHODES

Cette étude transversale descriptive a impliqué des enfants de moins de 5 ans hospitalisés pour le paludisme grave à l'hôpital Kouroussa en Guinée. Les données ont été collectées par un questionnaire d'enquête auto-conçu et par des dossiers médicaux des cas

CONCLUSION

Parmi les enfants hospitalisés de moins de cinq ans pendant la période de 2017 à 2023, la réquence de paludisme grave était de 6.4%, la tendance des décès des enfants dans la même période était à la baisse. Tous les patients ont été traités avec l'Artésunate injectable et 96% ont été guérie sans séquelle.

Results



INTRODUCTION

Malaria is a dreaded disease, especially for vulnerable populations such as pregnant women and children under five years old. The reduction in malaria deaths from 585,000 to 405,000 between 2010 and 2018 is a notable advancement, reflecting global efforts to combat this disease.

AIM OF THE WORK

To describe the epidemiological, clinical, therapeutic, and evolutionary aspects of severe malaria in children under 5 years old in the pediatric department of the Kouroussa hospital.

PATIENTS AND METHODS

This descriptive cross-sectional study involved children under 5 years of age hospitalized with severe malaria at Kouroussa Hospital in Guinea. Data were collected by a self-administered survey questionnaire and medical records of hospitalized cases.

CONCLUSION

Among hospitalized children under five years of age during the period 2017/2023, the frequency of severe malaria was 6.4%, the trend of child deaths in the same period was decreasing. All patients were treated with injectable Artesunate and 96% were cured without sequelae.